CANCERS DES OVAIRES / DES TROMPES / PRIMITIF DU PÉRITOINE

Néo Adjuvant

CHRONO

Chirurgie retardée du cancer avancé de l'ovaire après CT néoadjuvante

Entretien

OReO

Etude de Phase IIIb, multicentrique, randomisée, en double aveugle contre placebo, de l'Olaparib en traitement d'entretien chez des patientes atteintes de cancer épithélial de l'ovaire précédemment traité par iPARP et répondant à une nouvelle chimiothérapie à base de platine

Rechute

NiQoLe

Etude longitudinale évaluant, en conditions réelles d'utilisation, la tolérance du Niraparib en maintenance après une chimiothérapie à base de platine chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute tardive.

FIRST 3000-03-005/ENGOT OV-44

Etude de phase III, randomisée en double aveugle visant à comparer le traitement à base de platine associé au TSR-042 et au Niraparib et le traitement standard à base de platine comme traitement de première ligne du cancer de l'ovaire épithélial non mucineux de stade III ou IV.

CANCERS DE L'ENDOMETRE

Rechute / Métastatique

UTOLA

Etude de phase II multicentrique évaluant l'olaparib comme traitement de maintenance chez des patientes sensible au platine pour un carcinome endometrial avancé ou métastatique

CANCERS DU COL DE L'UTÉRUS

Entretien

ATEZOLACC

Etude de Phase II randomisée évaluant l'Atezolizumab, inhibiteur du ligand de mort cellulaire programmée de type 1, dans les cancers du col utérin localement évolués

Rechute / Métastatique

BEAT-CC

Essai de phase III randomisé comparant une chimiothérapie à base de platine, Bevacizumab et Atezolizumab à un traitement à base de platine et de Bevacizumab chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus métastatique (stade IVB), persistant ou en rechute.

KO-TIP-001

Étude de phase II en ouvert sur le tipifarnib dans les cancers non hématologiques avancés avec mutations HRAS. Carcinome épidermoïde (SCC) (*sauf tête et du cou*) avec mutation HRAS ; en échec aux traitements standards

AGENUS C-700-01

Étude de phase I/II ouverte, avec escalade de doses, visant à analyser la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, l'activité biologique et clinique de l'AGEN2034 chez des patients présentant des tumeurs solides métastatiques ou localement avancées, incluant les cancers du col de l'utérus en deuxième ligne de chimiothérapie.

MOVIE

Etude Basket phase I/II évaluant la combinaison de la vinorelbine métronomique orale et d'une association d'immunothérapie anti-PDL1/ anti-CTLA4 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées.