CANCERS PANCREATIQUES

Localement avancé

GEMCIPANC

EVALUATION DU GEMCITEST™ CHEZ LES PATIENTS DIAGNOSTIQUES AVEC UN CANCER DU PANCREAS ET TRAITES PAR

NEOPAN PRODIGE 29

Essai de phase III, randomisé, comparant une chimiothérapie par Folfirinox à la gemcitabine dans le traitement du cancer pancréatique localement avancé

1ière ligne métastatique

ARCS-MT - BAY 94-9343 - 15834

Étude de phase Ib, multi-indications, portant sur l'anetumab ravtansine (BAY 94-9343) administré chez des patients atteints de tumeurs malignes avancées ou récidivantes, exprimant la mésothéline

EPIC-1511

Impact sur la survie globale d'une prise en charge palliative précoce dans les cancers métastatiques du haut appareil digestif traités par une chimiothérapie de première ligne : étude randomisée de phase III

2ème ligne métastatique

CT 4006

Étude de phase 3 adaptative, randomisée, contrôlée, en ouvert visant à évaluer la sécurité et l'efficacité de l'association EndoTAG-1 plus gemcitabine par rapport à la gemcitabine seule chez les patients atteints d'un adénocarcinome du pancréas métastatique et/ou localement avancé mesurable n'ayant pas répondu à un traitement par FOLFIRINOX

Tumeur Neuro—Endocrine

BETTER 2

Etude de phase 2 randomisée de deux traitements par chimiothérapie avec ou sans Bevacizumab pour tumeur neuroendocrine bien différenciée du pancréas

GCO-001 NIPINEC

Etude GCO étudiant l'efficacité et la tolérance du nivolumab en monothérapie ou de l'association nivolumab – ipilimumab chez les patients pré-traités présentant une tumeur neuroendocrine peu différencié de stade avancé pulmonaire réfractaire ou gastroentéropancréatique.

CANCERS PANCREATIQUES

Localement avancé

COHORTE AMPULLOME (Damien 1365)

ADK de l'ampoule de Vater résécable ou récidivant de manière locorégionale ou métastatique après résection datant de moins de 6 mois

1ière ligne métastatique

CanStem111P (Céline 1290)

Adk métastatique, naif de CT , maladie mesurable, PS 0-1, 18<IMC<40