

# SARCOME DES TISSUS MOUS

## Avant chirurgie

### STRASS

Phase III Européenne (EORTC, S Bonvalot)  
testant la radiothérapie pré-opératoire  
Versus le traitement standard par chirurgie  
seule

## Après chirurgie

## Rechute

## Métastatique

### PréTOXE (Damien 1365)

Prédiction de la toxicités au TKI  
  
Patient > 70 ans traité par un TKI  
dans le cadre de son AMM

## Métastatique rechute

### LMS 04

Etude de Phase III multicentrique randomisée comparant l'efficacité de l'association doxorubicine et trabectedine suivie du trabectedine à celle de la doxorubicine en première ligne de chimiothérapie chez des patients présentant un léiomyosarcome (utérin et des tissus mous) métastatique et/ou localement avancé.

### AcSé Crizotinib

Accès sécurisé au crizotinib pour les patients souffrant d'une tumeur porteuse d'une altération génomique sur une des cibles biologiques de la molécule.

### AcSé Vemurafenib

ACCÈS SÉCURISÉ AU VEMURAFENIB POUR  
LES PATIENTS SOUFFRANT D'UNE TUMEUR  
PORTEUSE D'UNE ALTÉRATION GÉNOMIQUE  
DE BRAF

## SARCOME OSTÉOSARCOME

1ere ligne

Rechute

2ème ligne ou 3ème ligne

### CABONE

A PHASE II STUDY OF XL184 (CABOZANTINIB) IN TREATING PATIENTS WITH RELAPSED OSTEOSARCOMAS AND EWING SARCOMAS

Cohorte Ostéosarcome : Suspendue

### REGOBONE

A Randomized Phase II, placebo-controlled , multicenter study evaluating efficacy and safety of regorafenib in patients with metastatic bone sarcomas

## SARCOME D'EWING

1ere ligne

Rechute

2ème ligne ou 3ème ligne

### EURO- EWING 2012

Essai International, randomisé, contrôlé, portant sur le traitement des sarcomes d'Ewing nouvellement diagnostiqués.

### CABONE

A PHASE II STUDY OF XL184 (CABOZANTINIB) IN TREATING PATIENTS WITH RELAPSED OSTEOSARCOMAS AND EWING SARCOMAS