Chirurgie

CALIPSO
Identification des caractéristiques cliniques et biologiques des tumeurs du sein développées en présence d'implants mammaires esthétiques

IODINE BREAST
Repérage préopératoire des cancers mammaires infra-cliniques : repérage isotopique par grain d'iode125 versus repérage standard par guide métallique, essai prospectif randomisé

MAPAM
Mastectomie thérapeutique avec conservation de l'étui cutané et de la plaque aréolo-mamelonnaire, essai prospectif multicentrique à un bras

FIGARO
Faisabilité et Intérêt de la restadification ganglionnaire axillaire par la technique du GAnglion sentinelle et du curage axillaire dans les Récidives hOmolatérales de cancer infiltrant du sein

Radiothérapie

HYPOG-1
Etude de phase III : radiothérapie hypofractionnée vs radiothérapie standard avec indication d'irradiation ganglionnaire en termes de survenue de lymphoedème

RPO S+ Kévin 1749)

Etude de la technique de radiothérapie per-opératoire (RPO) par Papillon +TM dans le cancer du sein localisé

Adjuvant

Cancers du Sein HER2-

OLYMPIA
Olaparib vs Placebo en traitement d'entretien suite à 6 cycle minimum de chimio à base d'Antracycline et/ou de Taxanes
cancer du sein avec RH+/- et HER2- et BRCA 1 ou 2 muté (analyse en centralisé)

Métastatique

Cancers du Sein tout statut confondu

Cancers du Sein HER2-

SAFIR 02 (1ère ligne)
Evaluation de l'efficacité de la génomique à haut débit comme outil de décision thérapeutique pour les patientes porteuses d? un cancer du sein métastatique.

PADA-1 PACE-1 (1ère ligne)
Etude randomisée en ouvert de phase III évaluant la tolérance et l'efficacité du palbociclib en association avec une hormonothérapie dont la prescription est orientée par le suivi des mutations ESR1 de l'ADN tumoral circulant chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique avec des récepteurs aux oestrogènes positif et Her2 négatif

CBYL719X2402 BYLieve (2ème et 3ème ligne)
Étude de phase II non comparative, multicentrique, en ouvert, à deux bras de traitement, évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'alpelisib associé au fulvestrant ou au létrozole chez des patients atteints de cancer du sein à un stade avancé avec mutation du gène PIK3CA, récepteurs hormonaux positifs (RH+) et HER2 négatif, ayant progressé pendant ou après un traitement par inhibiteur de CDK 4/6

STEREO SEIN (1ère ligne)
Essai de supériorité de phase III de radiothérapie stéréotaxique pour les patientes atteintes de cancer du sein en première ligne métastatique.

SAFIR-PI3K (1ère et 2ème ligne)
Etude randomisée de phase II comparant l'alpelisib associé au fulvestrant à la chimiothérapie en traitement de maintenance chez les patients avec un cancer du sein avancé porteur d'une mutation PIK3CA.

Cancers du Sein HER2+

PATINA (1ère ligne)
Etude de phase III, randomisée, en ouvert, évaluant l'efficacité et la tolérance de l'association Palbociclib + traitement Anti-HER2 + hormonothérapie versus l'association d'un traitement anti-HER2 + hormonothérapie, après traitement d'Induction, dans le cancer du sein métastatique récepteurs hormonaux-positifs (HR +) et Her2-positif

Cancers du Sein Triple Negatif

ARCS-MT - BAY 94-9343 - 15834
(1ère ou 2ème ligne)
Étude de phase Ib, multi-indications, portant sur l'anetumab ravtansine (BAY 94-9343) administré chez des patients atteints de tumeurs malignes avancées ou récidivantes, exprimant la mésothéline

START UCBG3-06 (1ère ou 2ème ligne)
Etude de Phase II randomisée chez les patientes avec un cancer du sein triple négatif et des récepteurs aux androgènes positifs localement avancé (non résécable) ou métastatique traité par Darolutamide ou Capécitabine