Cancers Digestifs

Localement avancé

CONCORDE

Carcinome oesophagiens non opérés traités par chimioradiothérapie à base d'Oxaliplatine (FOLFOX-4) et radiothérapie à dose élevée. Etude de phase II-III

1ière ligne métastatique

8951-CL-0301 SPOTLIGHT Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, comparant l'efficacité du traitement par Zolbetuximab (IMAB362) +mFOLFOX6 par rapport à un traitement par placebo + mFOLFOX6 en première ligne chez des patients présentant un adénocarcinome de l'estomac ou de la jonction oesogastrique 18.2 -positif, HER2-négatif, localement avancé inopérable ou métastatique

EPIC-1511

Impact sur la survie globale d'une prise en charge palliative précoce dans les cancers métastatiques du haut appareil digestif traités par une chimiothérapie de première ligne : étude randomisée de phase III

2ème ligne métastatique

REGIRI

Essai de phase II randomisée évaluant l'utilisation du REGorafenib associé à l'IRInotecan en deuxième ligne de traitement chez les patients ayant un adénocarcinome oeso-gastrique métastatique

SOCRATE

Seconde ligne de Chimiothérapie avec RAmucirumab +/- pacliTaxel chez le sujet âgé avec un cancer avancé de l'estomac ou de la jonction oeso-gastrique

GCO-001 NIPINEC Etude GCO étudiant l'efficacité et la tolérance du nivolumab en monothérapie ou de l'association nivolumab – ipilimumab chez les patients prétraités présentant une tumeur neuroendocrine peu différencié de stade avancé pulmonaire réfractaire ou gastroentéropancréatique.