Sarcome des tissus mous

Avant chirurgie	1 ère ligne	2ème ligne	3ème ligne et plus

STEREOSARC

Etude de phase II randomisée, étude comparative de l'immunomodulation avec l'Atézolizumab concomitante à l'irradiation stéréotaxique à haute dose (SBRT) Versus SBRT seule chez les Patients atteints de Sarcome Oligométastatique Stereotaxic

EREMISS

Efficacité du regorafenib comme traitement de maintenance chez des patients atteints de sarcomes des tissus mous non-adipocytaires ayant reçu 6 cycles de chimiothérapie à base de doxorubicine en 1ère ligne.

KCP 330-020

(Phase 3 uniquement)

A Phase 2-3, multicenter, randomized, doubleblind study of Selinexor (KPT330) versus placebo in patients with advanced unresectable dedifferentiated liposarcoma (DDLS).

Métastatique rechute

RNASarc

Programme de screening moléculaire des sarcomes des tissus mous à génomique complexe visant à détecter les réarrangements de gènes NTRK1/2/3, ROS1 ou ALK.

Chordomes

1ère ligne	Rechute	2ème ligne ou 3ème ligne

REGOBONE

A Randomized Phase II, placebo-controlled , multicenter study evaluating efficacy and safety of regorafenib in patients with metastatic bone sarcomas (**COHORTE : sarcome avec réarrangement CIC)**

Ostéosarcome

1ère ligne	Rechute	2ème ligne ou 3ème ligne

Sarcome d'Ewing

1ere ligne	Rechute	2ème ligne ou 3ème ligne