Cancers de la Prostate

Rechute biochimique

CARLHA-2
Apalutamide, radiothérapie et agoniste de la LH-RH combinés chez des patients à haut risque de cancer de la prostate en rechute biochimique post-prostatectomie

Métastatique

1ère ligne

64091742PCR0002-PREVALENCE
Étude des biomarqueurs pour déterminer la fréquence d'anomalies de la réparation de l'ADN chez des hommes présentant un cancer de la prostate métastatique

mCRPC

PEACE 4
Etude de phase III évaluant l'impact sur la survie de l'acide acétylsalicylique et l'atorvastatine chez les patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration

mHSPC

PRESTO
Etude randomisée, contrôlée de phase III évaluant le rôle du traitement ablatif local des métastases chez les patients atteints de cancer de prostate oligométastatique hormonosensible.

CAPITELLO 281—D361BC0001
Etude de Phase III randomisée, en double-aveugle, et contrôlée par placebo évaluant l'efficacité et la tolérance de capivasertib + abiratérone versus placebo + abiratérone chez des patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate hormonosensible (mHSPC) nouvellement diagnostiqué, caractérisé par un déficit en PTEN

≥2ème ligne

mCRPC

MEGAMOST
Etude multicentrique de phase II, menée en ouvert, guidée par la biologie, évaluant l'activité de thérapies ciblant les altérations/caractéristiques moléculaires de tumeurs de stade avancé ou métastatique

COSMIC 21
Etude de phase 1b avec escalade de dose portant sur le cabozantinib (XL184) administré seul ou en association avec l'atézolizumab chez des patients atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques

Traitement antérieur par enzalutamid ou abiratérone

BAY-20510 / XOFIGO
Phase IV multicentrique, randomisée, en ouvert, visant à évaluer la sécurité et l'efficacité d'une dose standard de dichlorure de radium-223 par rapport à des doses standard d'un nouvel agent d'hormonothérapie (NAH) chez des patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique à prédominance osseuse ayant progressé sous traitement par une ligne de NAH ou après celui-ci

TO-TAS3681-101 / SYNH 1009682
Étude de phase 1, en ouvert, non randomisée, visant à évaluer la sécurité d'emploi, la tolérance et la pharmacocinétique du TAS3681 chez des patients présentant un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration

Cohorte A : mCRPC en progression après 1 HT 2nde génération et 1 ou 2 lignes de CT avec taxane

Cohorte b : mCRPC en progression après 1 HT 2nde génération

mHSPC

Mise à jour le 04/10/2021

Cancers Urothéliaux

Néoadjuvant

NEMIO
Etude de phase I/II évaluant en Néoadjuvant la chimiothérapie "ddMVAC" en association avec DURVALUMAB (MEDI4736) avec ou sans TREMELIMUMAB dans le carcinome urothélial invasif

BMS CA 045-009
Etude de Phase 3, randomisée, évaluant en néoadjuvant et adjuvant, Nivolumab plus NKTR-214, versus Nivolumab seul, versus le standard de soin chez des patients atteints d'un cancer de la vessie infiltrant le muscle, inéligibles au Cisplatine

BMS CA 017-078
Etude de phase III, randomisée, évaluant une chimiothérapie néoadjuvante seule à base de cisplatine *versus* une chimiothérapie néoadjuvante associée au Nivolumab ou au Nivolumab et BMS-986205, suivie d'une thérapie post-opératoire continue avec Nivolumab ou Nivolumab et BMS-986205 chez des patients atteints d'un cancer de la vessie envahissant le muscle
Clairance > 50 mL/min

Adjuvant

BO42843 / IMVIGOR 11
Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, évaluant atezolizumab (anticorps anti–PD-L1) *versus* placebo en traitement adjuvant chez des patients atteints d'un cancer de la vessie infiltrant le muscle à haut risque de récidive avec un statut ADNtc positif après une cystectomie

Radio-chimiothérapie

BLADDER SPARING—AFU GETUG 35
Radiochimiothérapie puis Atezolizumab en entretien chez les patients atteints de cancer de la vessie localisé, non éligible ou refusant une cystectomie : essai randomisé multicentrique de phase II

1ere ligne

TALASUR
Essai de phase 2 évaluant le Talazoparib et l'Avelumab comme traitement d'entretien dans le carcinome Urothélial métastatique ou localement avancé Sensible aux sels de platine

SGN22E-002 EV-103
Étude sur l'enfortumab vedotin (ASG-22CE) en monothérapie ou en association à d'autres traitements anticancéreux pour le traitement du cancer urothélial

2eme ligne

AMI
Analyse de l'évolution des profils protéomiques du Microbiote intestinal chez les patients porteurs d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastasique en fonction de leur réponse à l'immunothérapie par pembrolizumab (répondeurs versus non-répondeurs) : Etude pilote prospective.

IMMU 132-13
Étude de phase III en ouvert, randomisée, évaluant le sacituzumab govitécan contre le traitement choisi par le médecin chez des patients atteints d'un cancer urothélial métastatique ou localement avancé et non résécable

≥3 ème ligne

THOR 42756493BLC 3001
Étude de phase 3 évaluant l'ERDAFITINIB par rapport à la VINFLUNINE, au DOCETAXEL ou au PEMBROLIZUMAB chez des patients atteints d'un cancer urothélial avancé et présentant des altérations présélectionnées des gènes FGFR.

MEGAMOST
Etude multicentrique de phase II, menée en ouvert, guidée par la biologie, évaluant l'activité de thérapies ciblant les altérations/ caractéristiques moléculaires de tumeurs de stade avancé ou métastatique

Mise à jour le 04/10/2021

Cancers du rein

Adjuvant

RAMPART

Recherche plateforme de phase III, internationale, randomisée, contrôlée, multicentrique, multibras et multi-étapes (MAMS) évaluant des traitements adjuvants chez des patients atteints d'un carcinome rénal (CCR) localisé réséqué ayant un risque élevé ou intermédiaire de rechute.

Localement avancé /1ère ligne métastatique

2eme ligne

3eme ligne

MK -6482 -11

Etude en ouvert, randomisée, de phase III, évaluant le MK-6482 en combinaison avec le lenvatinib (MK-7902) vs le cabozantinib pour le traitement en deuxième ou troisième intention chez des participants ayant un carcinome rénal avancé qui ont progressé après un traitement antérieur par anti-PD-1/L1

CONTACT-03 / WO41994

Étude de phase III, multicentrique, randomisée, en ouvert, destinée à évaluer l'efficacité et la tolérance de l'Atezolizumab administré en association avec le cabozantinib versus le cabozantinib seul chez des patients atteints de carcinome à cellules rénales localement avancé non résécable ou métastatique ayant présenté une progression tumorale radiologique pendant ou après un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire (ligne précédente).

MEGAMOST

Etude multicentrique de phase II, menée en ouvert, guidée par la biologie, évaluant l'activité de thérapies ciblant les altérations/caractéristiques moléculaires de tumeurs de stade avancé ou métastatique

Cancers Squameux du Penis

1ere ligne

PEVOsq

Etude basket de phase 2 évaluant l'efficacité de la combinaison de pembrolizumab et de vorinostat chez des patients atteints d'un cancer épidermoïde récurrent et/ou métastatique.

Maintenance après 1ere ligne

PULSE

activité et tolérance d'une immunothérapie par AVELUMAB en maintenance chez des patients stables ou répondeurs après une première ligne de polychimiothérapie contenant un sel de platine dans le carcinome épidermoïde de verge (CEV) localement avancé ou métastatique